

SUMMARY

PERBEDAAN EFEK PENAMBAHAN TRAKSI OSILASI MAXIMALLY LOSE PACK POSITION (MLPP) PADA INTERVENSI SHORT WAVE DIATHERMY (SWD) TERHADAP PENINGKATAN LINGKUP GERAK SENDI (LGS) PADA CAPSULITIS ADHESIVA SENDI GLENOHUMERALIS

Created by Evi Kusuma Wati

Subject : PERBEDAAN EFEK PENAMBAHAN TRAKSI OSILASI

Subject Alt : PERBEDAAN EFEK PENAMBAHAN TRAKSI OSILASI

Keyword : PERBEDAAN EFEK PENAMBAHAN TRAKSI OSILASI MAXIMALLY LOSE PACK POSITION (MLPP) PADA INTERVENSI SHORT WAVE DIATHERMY (SWD) TERHADAP PENINGKATAN LINGKUP GERAK SENDI (LGS) PADA CAPSULITIS ADHESIVA SENDI GLENOHUMERALIS

Description :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek penambahan traksi osilasi Maximally Lose Pack Position (MLPP) pada intervensi SWD terhadap peningkatan lingkup gerak sendi (LGS) bahu pada penderita capsulitis adhesiva sendi glenohumeralis. Sampel penelitian ini berjumlah 30 orang dengan usia 40-64 tahun yang merupakan pasien-pasien rawat jalan pada Instalasi Fisioterapi Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Metode penelitian bersifat kuasi eksperimental guna mengetahui efek adanya penambahan intervensi (perlakuan) pada objek penelitian (variabel) disertai monitoring perubahan efek yaitu intervensi SWD pada perlakuan I dan intervensi SWD dengan penambahan traksi osilasi MLPP pada perlakuan II. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perlakuan I dan perlakuan II berdasarkan hasil uji t-test related, abduksi bahu dan rotasi bahu masing-masing didapatkan nilai $p = 0,000$, dimana $p < 0,05$, hal ini berarti ada efek yang signifikan baik dalam intervensi SWD maupun intervensi SWD dengan penambahan traksi osilasi MLPP terhadap peningkatan lingkup gerak sendi abduksi dan rotasi bahu pada penderita capsulitis adhesiva sendi glenohumeralis. Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan uji t-test independent untuk lingkup gerak sendi abduksi bahu didapatkan nilai $p = 0,054$ dan pada rotasi bahu didapatkan $p = 0,061$, dimana $p > 0,05$, hal ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara intervensi SWD dengan intervensi SWD yang dikombinasikan dengan penambahan traksi osilasi MLPP terhadap peningkatan lingkup gerak sendi abduksi bahu dan rotasi bahu pada penderita capsulitis adhesiva sendi glenohumeralis. Kesimpulan penelitian ini bahwa baik intervensi SWD maupun intervensi SWD dengan penambahan traksi osilasi MLPP mempunyai efek terhadap peningkatan LGS bahu pada penderita capsulitis adhesiva sendi glenohumeralis, namun tidak ada perbedaan yang signifikan atau bermakna antara intervensi SWD dan intervensi SWD dengan penambahan traksi osilasi MLPP terhadap peningkatan LGS bahu pada penderita capsulitis adhesiva sendi glenohumeralis.

Contributor : Sugijanto, Dipl. P.T.
Date Create : 19/12/2013
Type : Text
Format : PDF
Language : Indonesian
Identifier : UEU-Undergraduate-2009-65-098
Collection : 2009-65-098
Source : Perpustakaan Esa Unggul
Relation Collection Universitas Esa Unggul
COverage : Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul
Right : Copyright @2013 by UEU Library

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor