

SUMMARY

PERBEDAAN PEMBERIAN ASI DAN DEXTROSE 5 % TERHADAP RESPON NYERI PADA NEONATUS YANG DILAKUKAN PENGAMBILAN DARAH PADA TUMIT DI RSIA GRAND FAMILY JAKARTA

Created by MAYA SARI

Subject : PEMBERIAN ASI, DEXTROSE, NEONATUS

Subject Alt : Breastfeeding, DEXTROSE, NEONATUS

Keyword : Nyeri, bayi, pengambilan darah pada tumit, pemberian ASI, dextrose 5%

Description :

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan respon nyeri bayi yang dilakukan pengambilan darah pada tumit setelah diberikan intervensi pemberian ASI, Dextrose 5%. Desain penelitian ini adalah quasi experiment dengan postes kelompok intervensi nonekuivalen (after only nonequivalent). Sampel berjumlah 60 responden yang terbagii menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diberikan intervensi ASI, kedua diberikan dextrose 5%. Intervensi diberikan dua menit sebelum sampai setelah tindakan pengambilan darah pada tumit. Pengukuran respon nyeri dilakukan dengan menggunakan skala perilaku FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, and Consolability). Hasil dari penelitian uji independent samples test ini terdapat sig (2-tailed) 0,000 dimana p-value <0,05. Simpulan ada perbedaan respon nyeri yang bermakna antara kedua kelompok tersebut, dimana respon nyeri pada kelompok yang diberikan ASI lebih rendah dibandingkan yang diberikan dextrose 5%.

Contributor : ANTIA

Date Create : 05/08/2017

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-201533071

Collection : 201533071

Source : Undergraduate Theses of Ners

Relation Collection FAKULTAS ILMU KESEHATAN

COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : @perpustakaan Universitas Esa Unggul 2017

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor