

SUMMARY

PERBEDAAN PEMBERIAN ASI DAN DEXTROSE 5 % TERHADAP RESPON NYERI PADA NEONATUS YANG DILAKUKAN PENGAMBILAN DARAH PADA TUMIT DI RSIA GRAND FAMILY JAKARTA

Created by MAYA SARI

Subject : PEMBERIAN ASI, DEXTROSE, NEONATUS
Subject Alt : Breastfeeding, DEXTROSE, NEONATUS
Keyword : Nyeri, bayi, pengambilan darah pada tumit, pemberian ASI, dextrose 5%

Description :

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan respon nyeri bayi yang dilakukan pengambilan darah pada tumit setelah diberikan intervensi pemberian ASI, Dextrose 5%. Desain penelitian ini adalah quasi experiment dengan postes kelompok intervensi nonekuivalen (after only nonequivalent). Sampel berjumlah 60 responden yang terbagii menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diberikan intervensi ASI, kedua diberikan dextrose 5%. Intervensi diberikan dua menit sebelum sampai setelah tindakan pengambilan darah pada tumit. Pengukuran respon nyeri dilakukan dengan menggunakan skala perilaku FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, and Consolability). Hasil dari penelitian uji independent samples test ini terdapat sig (2-tailed) 0,000 dimana p-value <0,05. Simpulan ada perbedaan respon nyeri yang bermakna antara kedua kelompok tersebut, dimana respon nyeri pada kelompok yang diberikan ASI lebih rendah dibandingkan yang diberikan dextrose 5%.

Contributor : ANTIA
Date Create : 05/08/2017
Type : Text
Format : PDF
Language : Indonesian
Identifier : UEU-Undergraduate-201533071
Collection : 201533071
Source : Undergraduate Theses of Ners
Relation Collection FAKULTAS ILMU KESEHATAN
COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul
Right : @perpustakaan Universitas Esa Unggul 2017

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor