

## SUMMARY

# PERBEDAAN PEMBERIAN ASI DAN DEXTROSE 5 % TERHADAP RESPON NYERI PADA NEONATUS YANG DILAKUKAN PENGAMBILAN DARAH PADA TUMIT DI RSIA GRAND FAMILY JAKARTA

Created by MAYA SARI

**Subject** : PEMBERIAN ASI, DEXTROSE, NEONATUS  
**Subject Alt** : Breastfeeding, DEXTROSE, NEONATUS  
**Keyword** : Nyeri, bayi, pengambilan darah pada tumit, pemberian ASI, dextrose 5%

### Description :

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan respon nyeri bayi yang dilakukan pengambilan darah pada tumit setelah diberikan intervensi pemberian ASI, Dextrose 5%. Desain penelitian ini adalah quasi experiment dengan postes kelompok intervensi nonekuivalen ( after only nonequivalent ). Sampel berjumlah 60 responden yang terbagii menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diberikan intervensi ASI, kedua diberikan dextrose 5%. Intervensi diberikan dua menit sebelum sampai setelah tindakan pengambilan darah pada tumit. Pengukuran respon nyeri dilakukan dengan menggunakan skala perilaku FLACC ( Face, Leg, Activity, Cry, and Consolability ). Hasil dari penelitian uji independent samples test ini terdapat sig (2-tailed) 0,000 dimana p-value <0,05. Simpulan ada perbedaan respon nyeri yang bermakna antara kedua kelompok tersebut, dimana respon nyeri pada kelompok yang diberikan ASI lebih rendah dibandingkan yang diberikan dextrose 5%.

**Contributor** : ANTIA  
**Date Create** : 05/08/2017  
**Type** : Text  
**Format** : PDF  
**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Undergraduate-201533071  
**Collection** : 201533071  
**Source** : Undergraduate Theses of Ners  
**Relation Collection** FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : @perpustakaan Universitas Esa Unggul 2017

### Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

### Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( [astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id](mailto:astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id) )

Supervisor