

## ABSTRAK

**Nama** : Robiatul Adawiyah  
**Program Studi** : Kesehatan Masyarakat  
**Judul** : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PREEKLAMPSI BERAT (PEB) PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANGERANG TAHUN 2018**

Ibu hamil yang mengalami preeklampsia berat beresiko tinggi mengalami kematian. Sementara pada janin akan mengalami kekurangan oksigen dan makanan. Menurut data pada bagian rekam medis rumah sakit umum daerah tangerang tahun 2016 terdapat 1.156 (70 %) kasus dari 1.925 pasien dalam setahun yaitu Hipertensi akibat kehamilan dengan proteinuria/ preeklampsia (hamil dengan PEB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya preeklampsia berat pada ibu hamil trimester III di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain *Cross Sectional*. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester III sebanyak 127 orang. Berdasarkan hasil uji statistik bahwa terdapat hubungan antara usia ( $P Value = 0,000$ ), riwayat preeklampsia pada keluarga ( $P Value = 0,024$ ), paritas ( $P Value = 0,000$ ) dan riwayat hipertensi ( $P Value = 0,000$ ) dengan terjadinya preeklampsia berat pada ibu hamil trimester III, sedangkan tidak terdapat hubungan antara pendidikan ( $P Value = 0,074$ ), jarak kehamilan ( $P Value = 0,237$ ) dan indeks masa tubuh ( $P Value = 0,126$ ) Disarankan agar tenaga kesehatan lebih menegaskan tentang preeklampsia berat, dan bahayanya kepada semua ibu hamil.

**Kata Kunci** : Preeklampsia Berat, Ibu Hamil Trimester III

6 Bab, 59 Halaman, 19 Tabel, 2 Gambar, 8 Lampiran

Kepustakaan : 46 (2003-2017)

## ABSTRACT

**Name** : Robiatul Adawiyah  
**Program Of Study** : Public Health  
**Title** : **FACTORS THAT INFLUENCE THE SERIOUS PREECLAMPSI IN PREGNANT WOMAN TRIMESTER III AT THE GENERAL HOSPITAL OF TANGERANG REGION IN 2018.**

*Pregnant women with severe preeclampsia are at increased risk of death. While the fetus will experience lack of oxygen and food. According to data on the medical record of tangerang general hospital in 2016 there are 1,156 (70%) cases of 1,925 patients in a year. Hypertension due to pregnancy with proteinuria / preeclampsia (pregnant with PEB). This study aims to determine the factors that influence the occurrence of severe preeclampsia in pregnant women third trimester at Tangerang Regional General Hospital Year 2018. This type of research is quantitative with Cross Sectional design. The sample in this study was 127th trimester pregnant women as many as 127 people. Based on the result of statistical test that there is relationship between age ( $P$  Value = 0,000), family preeclampsia history ( $P$  Value = 0,024), parity ( $P$  Value = 0,000) and history of hypertension ( $P$  Value = 0,000) with the occurrence of severe preeclampsia in pregnant women ( $P$  Value = 0,237) and body mass index ( $P$  Value = 0,126) It is suggested that health workers should be more confident about severe preeclampsia, and the danger to all pregnant women .*

*Key words : Factors, Serious preeclampsia, Pregnant women trimester III*

*6 Chapter, 59 Pages, 16 Tabela, 2 Pictures, 8 Appendices*

*Literature : 46 (2003-2017)*