

ABSTRAK

Nama : Inayatul 'Aliyyah
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Preeklampsia pada Ibu Hamil Trimester II dan III di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang tahun 2018

Preeklampsia adalah hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria dan edema. Tahun 2016 preeklampsia menjadi penyakit ke tiga terbesar di RSUD Kabupaten Tangerang. Tahun 2017 preeklampsia meningkat menjadi penyakit ke dua terbesar sebanyak 869 (4%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara usia, pengetahuan, paritas, jarak kehamilan, dan riwayat hipertensi dengan preeklampsia pada ibu hamil trimester II dan III di RSUD Kabupaten Tangerang tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan rancangan *Cross Sectional* dengan jumlah sampel 97 ibu hamil trimester II dan III. Dari hasil penelitian diperoleh faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil trimester II dan III adalah usia (nilai $p = 0.038$), jarak kehamilan (nilai $p = 0.044$), dan riwayat hipertensi (nilai $p = 0.002$). Dari hasil penelitian ada 24 (24.7%) ibu dengan preeklampsia. Disarankan ibu rutin kontrol kehamilan khususnya ibu dengan usia, jarak kehamilan yang berisiko dan ibu dengan riwayat hipertensi serta disarankan untuk petugas kesehatan memberikan promosi kesehatan kepada ibu hamil khususnya ibu dengan kehamilan pertama kali tentang KB dan tanda bahaya preeklampsia.

Kata Kunci : Preeklampsia, Ibu Hamil Trimester II dan III, Usia, Jarak Kehamilan, Riwayat Hipertensi
xiii+59 halaman ; 2 gambar, 14 daftar tabel
pustaka : 41 (2006-2018)