

## Lampiran II Output SPSS

### 1. Berdasarkan Usia

#### kelompok usia penderita

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤30 tahun	104	68.9	68.9	68.9
	> 30 tahun	47	31.1	31.1	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

#### usia penderita

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11	1	.7	.7	.7
	13	1	.7	.7	1.3
	16	3	2.0	2.0	3.3
	17	5	3.3	3.3	6.6
	18	2	1.3	1.3	7.9
	19	9	6.0	6.0	13.9
	20	11	7.3	7.3	21.2
	21	7	4.6	4.6	25.8
	22	7	4.6	4.6	30.5
	23	9	6.0	6.0	36.4
	24	11	7.3	7.3	43.7
	25	9	6.0	6.0	49.7
	26	2	1.3	1.3	51.0
	27	6	4.0	4.0	55.0
	28	9	6.0	6.0	60.9
	29	5	3.3	3.3	64.2
	30	7	4.6	4.6	68.9
	31	4	2.6	2.6	71.5
	32	8	5.3	5.3	76.8
	33	3	2.0	2.0	78.8
34	2	1.3	1.3	80.1	
35	4	2.6	2.6	82.8	
36	1	.7	.7	83.4	
37	1	.7	.7	84.1	
38	4	2.6	2.6	86.8	
40	3	2.0	2.0	88.7	

41	1	.7	.7	89.4
42	2	1.3	1.3	90.7
43	1	.7	.7	91.4
44	1	.7	.7	92.1
45	1	.7	.7	92.7
46	3	2.0	2.0	94.7
48	2	1.3	1.3	96.0
51	1	.7	.7	96.7
54	1	.7	.7	97.4
56	2	1.3	1.3	98.7
57	1	.7	.7	99.3
63	1	.7	.7	100.0
Total	151	100.0	100.0	

## 2. Berdasarkan Jenis Kelamin

### jenis kelamin penderita

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	140	92.7	92.7	92.7
	perempuan	11	7.3	7.3	100.0
Total		151	100.0	100.0	

## 3. Berdasarkan Pendidikan

### pendidikan terakhir penderita

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD/ sederajat	10	6.6	6.6	6.6
	SMP/ sederajat	14	9.3	9.3	15.9
	SMA/ sederajat	69	45.7	45.7	61.6
	Akademi/PT	58	38.4	38.4	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

#### 4. Berdasarkan Pekerjaan

##### pekerjaan penderita

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bekerja	59	39.1	39.1	39.1
	PNS/TNI	2	1.3	1.3	40.4
	Wiraswasta	45	29.8	29.8	70.2
	Karyawan Swasta	26	17.2	17.2	87.4
	Pelajar/Mahasiswa	19	12.6	12.6	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

#### 5. Berdasarkan Jenis Gangguan Jiwa

##### jenis gangguan jiwa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	mental and behavioural disorders duo to use of opioids	8	5.3	5.3	5.3
	mental and behavioural disorders due to use cannabinoids	17	11.3	11.3	16.6
	mental and behavioural disoorders due to use of sedative or hypnotics	8	5.3	5.3	21.9
	mental and behavioural disoorders due to use of other stimulant, including caffeine	63	41.7	41.7	63.6
	mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances	55	36.4	36.4	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

## 6. Berdasarkan Jumlah Pemakaian NAPZA

### jenis zat yang dikonsumsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Putaw, Tramadol	8	5.3	5.3	5.3
	Ganja	17	11.3	11.3	16.6
	Benzo, Alprazolam	8	5.3	5.3	21.9
	Sabu-sabu, Amfetamin, Metamfetamin	63	41.7	41.7	63.6
	Multiple Drug	55	36.4	36.4	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

### jumlah pemakaian zat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Multiple Drug	55	36.4	36.4	36.4
	Non Multiple Drug	96	63.6	63.6	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

## 7. Berdasarkan Alasan Pemakaian NAPZA

### alasan pemakaian zat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	coba-coba	26	17.2	17.2	17.2
	gangguan kepribadian	15	9.9	9.9	27.2
	pandangan keliru	28	18.5	18.5	45.7
	masalah keluarga	15	9.9	9.9	55.6
	lingkungan tempat tinggal	30	19.9	19.9	75.5
	pengaruh teman sebaya	37	24.5	24.5	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

### alasan pemakaian napza

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Faktor Individu	69	45.7	45.7	45.7
	Faktor Lingkungan	82	54.3	54.3	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

### 8. Berdasarkan Gejala Awal

#### gejala awal yang dialami

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	gangguan pikiran	30	19.9	19.9	19.9
	gangguan perilaku	31	20.5	20.5	40.4
	gangguan pikiran dan perilaku	90	59.6	59.6	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

### 9. Berdasarkan Lama Pemakaian NAPZA

#### lama pemakaian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	14	9.3	9.3	9.3
	2	32	21.2	21.2	30.5
	3	40	26.5	26.5	57.0
	4	24	15.9	15.9	72.8
	5	16	10.6	10.6	83.4
	6	8	5.3	5.3	88.7
	7	5	3.3	3.3	92.1
	8	6	4.0	4.0	96.0
	9	3	2.0	2.0	98.0
	10	3	2.0	2.0	100.0
	Total	151	100.0	100.0	

### lama pemakaian kategorik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤5 tahun	126	83.4	83.4	83.4
	>5 tahun	25	16.6	16.6	100.0
Total		151	100.0	100.0	

## LAMPIRAN CROSSTAB

### 1. Hasil Crosstab Faktor Usia dengan Faktor Lingkungan

#### kelompok usia penderita \* alasan pemakaian napza Crosstabulation

		alasan pemakaian napza			
			Faktor Individu	Faktor Lingkungan	Total
kelompok usia penderita	≤30 tahun	Count	39	65	104
		% within kelompok usia penderita	37.5%	62.5%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	56.5%	79.3%	68.9%
		% of Total	25.8%	43.0%	68.9%
	> 30 tahun	Count	30	17	47
		% within kelompok usia penderita	63.8%	36.2%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	43.5%	20.7%	31.1%
		% of Total	19.9%	11.3%	31.1%
Total		Count	69	82	151
		% within kelompok usia penderita	45.7%	54.3%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	45.7%	54.3%	100.0%

## 2. Hasil Crosstab Usia 15-17 dengan Faktor Lingkungan

## usia penderita \* alasan pemakaian napza Crosstabulation

		alasan pemakaian napza			
		Faktor Individu	Faktor Lingkungan	Total	
usia penderita	11	Count	0	1	1
		% within usia penderita	0.0%	100.0%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	0.0%	1.2%	0.7%
		% of Total	0.0%	0.7%	0.7%
	13	Count	0	1	1
		% within usia penderita	0.0%	100.0%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	0.0%	1.2%	0.7%
		% of Total	0.0%	0.7%	0.7%
	16	Count	0	3	3
		% within usia penderita	0.0%	100.0%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	0.0%	3.7%	2.0%
		% of Total	0.0%	2.0%	2.0%
	17	Count	2	3	5
		% within usia penderita	40.0%	60.0%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	2.9%	3.7%	3.3%
		% of Total	1.3%	2.0%	3.3%
	18	Count	0	2	2
		% within usia penderita	0.0%	100.0%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	0.0%	2.4%	1.3%
		% of Total	0.0%	1.3%	1.3%
19	Count	3	6	9	
	% within usia penderita	33.3%	66.7%	100.0%	
	% within alasan pemakaian napza	4.3%	7.3%	6.0%	
	% of Total	2.0%	4.0%	6.0%	
20	Count	0	11	11	
	% within usia penderita	0.0%	100.0%	100.0%	

	% within alasan pemakaian napza	0.0%	13.4%	7.3%
	% of Total	0.0%	7.3%	7.3%
21	Count	2	5	7
	% within usia penderita	28.6%	71.4%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	2.9%	6.1%	4.6%
	% of Total	1.3%	3.3%	4.6%
22	Count	5	2	7
	% within usia penderita	71.4%	28.6%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	7.2%	2.4%	4.6%
	% of Total	3.3%	1.3%	4.6%
23	Count	3	6	9
	% within usia penderita	33.3%	66.7%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	4.3%	7.3%	6.0%
	% of Total	2.0%	4.0%	6.0%
24	Count	5	6	11
	% within usia penderita	45.5%	54.5%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	7.2%	7.3%	7.3%
	% of Total	3.3%	4.0%	7.3%
25	Count	1	8	9
	% within usia penderita	11.1%	88.9%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	1.4%	9.8%	6.0%
	% of Total	0.7%	5.3%	6.0%
26	Count	2	0	2
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	2.9%	0.0%	1.3%
	% of Total	1.3%	0.0%	1.3%
27	Count	2	4	6
	% within usia penderita	33.3%	66.7%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	2.9%	4.9%	4.0%
	% of Total	1.3%	2.6%	4.0%
28	Count	5	4	9



	% within usia penderita	55.6%	44.4%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	7.2%	4.9%	6.0%
	% of Total	3.3%	2.6%	6.0%
29	Count	4	1	5
	% within usia penderita	80.0%	20.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	5.8%	1.2%	3.3%
	% of Total	2.6%	0.7%	3.3%
30	Count	5	2	7
	% within usia penderita	71.4%	28.6%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	7.2%	2.4%	4.6%
	% of Total	3.3%	1.3%	4.6%
31	Count	2	2	4
	% within usia penderita	50.0%	50.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	2.9%	2.4%	2.6%
	% of Total	1.3%	1.3%	2.6%
32	Count	3	5	8
	% within usia penderita	37.5%	62.5%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	4.3%	6.1%	5.3%
	% of Total	2.0%	3.3%	5.3%
33	Count	1	2	3
	% within usia penderita	33.3%	66.7%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	1.4%	2.4%	2.0%
	% of Total	0.7%	1.3%	2.0%
34	Count	0	2	2
	% within usia penderita	0.0%	100.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	0.0%	2.4%	1.3%
	% of Total	0.0%	1.3%	1.3%
35	Count	2	2	4
	% within usia penderita	50.0%	50.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	2.9%	2.4%	2.6%
	% of Total	1.3%	1.3%	2.6%

36	Count	0	1	1
	% within usia penderita	0.0%	100.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	0.0%	1.2%	0.7%
	% of Total	0.0%	0.7%	0.7%
37	Count	1	0	1
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	1.4%	0.0%	0.7%
	% of Total	0.7%	0.0%	0.7%
38	Count	3	1	4
	% within usia penderita	75.0%	25.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	4.3%	1.2%	2.6%
	% of Total	2.0%	0.7%	2.6%
40	Count	3	0	3
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	4.3%	0.0%	2.0%
	% of Total	2.0%	0.0%	2.0%
41	Count	1	0	1
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	1.4%	0.0%	0.7%
	% of Total	0.7%	0.0%	0.7%
42	Count	0	2	2
	% within usia penderita	0.0%	100.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	0.0%	2.4%	1.3%
	% of Total	0.0%	1.3%	1.3%
43	Count	1	0	1
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	1.4%	0.0%	0.7%
	% of Total	0.7%	0.0%	0.7%
44	Count	1	0	1
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	1.4%	0.0%	0.7%
	% of Total	0.7%	0.0%	0.7%

	% of Total	0.7%	0.0%	0.7%
45	Count	1	0	1
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	1.4%	0.0%	0.7%
	% of Total	0.7%	0.0%	0.7%
46	Count	3	0	3
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	4.3%	0.0%	2.0%
	% of Total	2.0%	0.0%	2.0%
48	Count	2	0	2
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	2.9%	0.0%	1.3%
	% of Total	1.3%	0.0%	1.3%
51	Count	1	0	1
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	1.4%	0.0%	0.7%
	% of Total	0.7%	0.0%	0.7%
54	Count	1	0	1
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	1.4%	0.0%	0.7%
	% of Total	0.7%	0.0%	0.7%
56	Count	2	0	2
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	2.9%	0.0%	1.3%
	% of Total	1.3%	0.0%	1.3%
57	Count	1	0	1
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	1.4%	0.0%	0.7%
	% of Total	0.7%	0.0%	0.7%
63	Count	1	0	1
	% within usia penderita	100.0%	0.0%	100.0%

	% within alasan pemakaian napza	1.4%	0.0%	0.7%
	% of Total	0.7%	0.0%	0.7%
Total	Count	69	82	151
	% within usia penderita	45.7%	54.3%	100.0%
	% within alasan pemakaian napza	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	45.7%	54.3%	100.0%

### 3. Hasil Crosstab lama pemakaian dengan jenis zat yang digunakan

#### lama pemakaian kategorik \* jenis zat yang dikonsumsi Crosstabulation

			jenis zat yang dikonsumsi					
			Putaw, Tramadol	Ganja	Benzo, Alprazol am	Sabu- sabu, Amfeta min, Metamfe tamin	Multiple Drug	Total
lama pemakaian kategorik	≤5 tahun	Count	5	13	6	55	47	126
		% within lama pemakaian kategorik	4.0%	10.3%	4.8%	43.7%	37.3%	100.0%
		% within jenis zat yang dikonsumsi	62.5%	76.5%	75.0%	87.3%	85.5%	83.4%
		% of Total	3.3%	8.6%	4.0%	36.4%	31.1%	83.4%
	>5 tahun	Count	3	4	2	8	8	25
		% within lama pemakaian kategorik	12.0%	16.0%	8.0%	32.0%	32.0%	100.0%
		% within jenis zat yang dikonsumsi	37.5%	23.5%	25.0%	12.7%	14.5%	16.6%
		% of Total	2.0%	2.6%	1.3%	5.3%	5.3%	16.6%
Total	Count	8	17	8	63	55	151	
	% within lama pemakaian kategorik	5.3%	11.3%	5.3%	41.7%	36.4%	100.0%	
	% within jenis zat yang dikonsumsi	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	5.3%	11.3%	5.3%	41.7%	36.4%	100.0%	

## 4. Gejala awal dengan jenis napza yang dikonsumsi

## gejala awal yang dialami \* jenis zat yang dikonsumsi Crosstabulation

		jenis zat yang dikonsumsi				
		Putaw, Tramadol	Ganj a	Benzo, Alprazol am	Sabu- sabu, Amfeta min, Metamfe tamin	Multiple Drug
gangguan pikiran	Count	1	6	1	11	11
	% within gejala awal yang dialami	3.3%	20.0 %	3.3%	36.7%	36.7%
	% within jenis zat yang dikonsumsi	12.5%	35.3 %	12.5%	17.5%	20.0%
	% of Total	0.7%	4.0%	0.7%	7.3%	7.3%
gangguan perilaku	Count	1	5	4	11	10
	% within gejala awal yang dialami	3.2%	16.1 %	12.9%	35.5%	32.3%
	% within jenis zat yang dikonsumsi	12.5%	29.4 %	50.0%	17.5%	18.2%

	% of Total	0.7%	3.3%	2.6%	7.3%	6.6%
gangguan pikiran dan perilaku	Count	6	6	3	41	34
	% within gejala awal yang dialami	6.7%	6.7%	3.3%	45.6%	37.8%
	% within jenis zat yang dikonsumsi	75.0%	35.3 %	37.5%	65.1%	61.8%
	% of Total	4.0%	4.0%	2.0%	27.2%	22.5%
Total	Count	8	17	8	63	55
	% within gejala awal yang dialami	5.3%	11.3 %	5.3%	41.7%	36.4%
	% within jenis zat yang dikonsumsi	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

% of Total	5.3%	11.3 %	5.3%	41.7%	36.4%
------------	------	-----------	------	-------	-------

### 5. Gejala awal dengan jumlah zat yang dikonsumsi

#### gejala awal yang dialami \* jumlah pemakaian zat Crosstabulation

		jumlah pemakaian zat			
		Multiple Drug	Non Multiple Drug	Total	
gejala awal yang dialami	gangguan pikiran	Count	11	19	30
		% within gejala awal yang dialami	36.7%	63.3%	100.0%
		% within jumlah pemakaian zat	20.0%	19.8%	19.9%
		% of Total	7.3%	12.6%	19.9%
gangguan perilaku		Count	10	21	31
		% within gejala awal yang dialami	32.3%	67.7%	100.0%
		% within jumlah pemakaian zat	18.2%	21.9%	20.5%
		% of Total	6.6%	13.9%	20.5%
gangguan pikiran dan perilaku		Count	34	56	90
		% within gejala awal yang dialami	37.8%	62.2%	100.0%
		% within jumlah pemakaian zat	61.8%	58.3%	59.6%
		% of Total	22.5%	37.1%	59.6%
Total		Count	55	96	151
		% within gejala awal yang dialami	36.4%	63.6%	100.0%
		% within jumlah pemakaian zat	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	36.4%	63.6%	100.0%

## 6. Pendidikan dengan usia

**pendidikan terakhir penderita \* kelompok usia penderita Crosstabulation**

		kelompok usia penderita		Total	
		≤30 tahun	> 30 tahun		
pendidikan terakhir penderita	SD/ sederajat	Count	9	1	10
		% within pendidikan terakhir penderita	90.0%	10.0%	100.0%
		% within kelompok usia penderita	8.7%	2.1%	6.6%
		% of Total	6.0%	0.7%	6.6%
	SMP/ sederajat	Count	12	2	14
		% within pendidikan terakhir penderita	85.7%	14.3%	100.0%
		% within kelompok usia penderita	11.5%	4.3%	9.3%
		% of Total	7.9%	1.3%	9.3%
	SMA/ sederajat	Count	50	19	69
	% within pendidikan terakhir penderita	72.5%	27.5%	100.0%	
	% within kelompok usia penderita	48.1%	40.4%	45.7%	
	% of Total	33.1%	12.6%	45.7%	
Akademi/ Perguruan Tinggi	Count	33	25	58	
	% within pendidikan terakhir penderita	56.9%	43.1%	100.0%	
	% within kelompok usia penderita	31.7%	53.2%	38.4%	
	% of Total	21.9%	16.6%	38.4%	
Total	Count	104	47	151	
	% within pendidikan terakhir penderita	68.9%	31.1%	100.0%	
	% within kelompok usia penderita	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	68.9%	31.1%	100.0%	

## 7. Pendidikan dengan lingkungan



**pendidikan terakhir penderita \* alasan pemakaian napza Crosstabulation**

		alasan pemakaian napza			
		Faktor Individu	Faktor Lingkungan	Total	
pendidikan terakhir penderita	SD/ sederajat	Count	5	5	10
		% within pendidikan terakhir penderita	50.0%	50.0%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	7.2%	6.1%	6.6%
		% of Total	3.3%	3.3%	6.6%
	SMP/ sederajat	Count	4	10	14
		% within pendidikan terakhir penderita	28.6%	71.4%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	5.8%	12.2%	9.3%
		% of Total	2.6%	6.6%	9.3%
	SMA/ sederajat	Count	32	37	69
		% within pendidikan terakhir penderita	46.4%	53.6%	100.0%
		% within alasan pemakaian napza	46.4%	45.1%	45.7%
		% of Total	21.2%	24.5%	45.7%
Akademi/ Perguruan Tinggi	Count	28	30	58	
	% within pendidikan terakhir penderita	48.3%	51.7%	100.0%	
	% within alasan pemakaian napza	40.6%	36.6%	38.4%	
	% of Total	18.5%	19.9%	38.4%	
Total	Count	69	82	151	
	% within pendidikan terakhir penderita	45.7%	54.3%	100.0%	
	% within alasan pemakaian napza	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	45.7%	54.3%	100.0%	