

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
SKRIPSI, Juli 2018**

DEAH AYU DIAN SARI
2014-33-016

“PENGARUH LATIHAN PENGATURAN POSISI TERHADAP RESIKO LUKE

DEKUBITUS PADA PASIEN TIRAH BARING JAKARTA BARAT TAHUN 2018.”

Xviii + 7 BAB + 81 Halaman + 11 Tabel + 2 Gambar + 4 Skema + 18 Lampiran

ABSTRACT

Dekubitus merupakan masalah yang sangat serius terutama bagi pasien yang harus dirawat lama di rumah sakit dengan keterbatasan aktifitas pasien dengan immobilisasi yang berlangsung lama berpotensi besar untuk mengalami dekubitus. Survei yang dilakukan WHO (2008) terhadap 55 rumah sakit di 14 negara menunjukkan 8,7% dari rumah sakit tersebut terdapat pasien dengan luka dekubitus. Selain itu, survei mengatakan bahwa 1,4 juta orang diseluruh dunia menderita luka dekubitus akibat perawatan di rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada Pengaruh Latihan Pengaturan Posisi Terhadap Resiko Luka Dekubitus Pada Pasien Tirah Baring Di Kerja Puskesmas Kebon Jeruk Tahun 2018. Sampel yang digunakan adalah Pasien Tirah Baring yang mengalami resiko luka dekubitus di Wilayah Kerja Puskesmas Kebon Jeruk dengan jumlah responden 35 orang. Metode penelitian yang digunakan *Pre Ekperimental* dengan bentuk *One Group Pre – Post Test Design*. Uji statistik yang digunakan adalah uji wilcoxon signed rank berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil p-value sebesar 0,000 (<0,05) yang berarti terdapat pengaruh bermakna antara Pengaturan Posisi Terhadap Resiko Luka Dekubitus Pada Pasien Tirah Baring di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Tahun 2018. Disarankan untuk pihak Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk sebaiknya lebih memerhatikan hal yang rentan dialami oleh penyakit yang memiliki kelemahan fisik untuk mengatur posisi, sehingga perawat harus lebih dini mengidentifikasi untuk menjecah terjadinya resiko luka pasien dalam melakukan alih baring TIM KPLDH (Ketuk Pintu Layani Dengan Hati).

Kata Kunci :Pengaturan Posisi, Resiko Dekubitus, Tirah Baring

**STUDY PROGRAM OF NURSING
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
UNIVERSITY OF ESA UNGGUL**

Minithesis, July 2018

DEAH AYU DIAN SARI

2014-33-016

“THE EFFECT OF GAZE STABILITY EXERCISE ON THE IMPROVEMENT OF BALANCES IN POST-PARTNED STROKE NON HEMORAGIC IN PUSKESMAS KEBON JERUK IN WEST JAKARTA 2018.”

Xviii +7 Chapter + 84 Pages+ 11 Tables + 4 Images + 4 Schemes + 18 Appendices

ABSTRACT

Decubitus serious matter especially for patient who have to be treated long in hospital with limit activity and long term immobilize have great potential to sustain decubitus. In 2008 WHO realised a survey of 55 hospital in 14 country that showing 8,7% patient in surveyed decubitus wound after being treated in hospital. This research purposes is to identify if there is impact from positioning exercise with risk decubitus wound n patient tirah baring in work Working Area of PHC Kebon Jeruk 2018. 35 patient Working Area of PHC Kebon Jeruk with 35 respondents. The research method used Pre Experimental with form of One Group Pre - Post Test Design. The statistic test used is wilcoxon signed rank test based on the results of the research obtained p-value of 0.000 (<0.05) which means there is effect from positioning exercise with risk of decubitus wound on patient tirah baring in the work in Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk. We giving advice to more carefully regarding patient who have physical weakness to positioning , so care take must identify earlier in order to prevent injuring patient in doing alih baring of TEAM KPLDH (KetukPintuLayaniDenganHati)

Kata Kunci :Pengaturan Posisi, Resiko Dekubitus, Tirah Baring