

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI ILMU GIZI
SKRIPSI, MARET 2013

NI WAYAN HERWINDA OKTAFIANA

HUBUNGAN ANTARA FREKUENSI PEMERIKSAAN ANTENATAL CARE DAN KEPATUHAN KONSUMSI TABLET BESI PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DENGAN KADAR HEMOGLOBIN di PUSKESMAS KECAMATAN CAKUNG

ii, VI Bab, 80 Halaman, 7 Tabel, 2 Grafik, 10 Diagram 4 Lampiran

Latar Belakang : Anemia merupakan masalah kesehatan yang biasa ditemui di negara berkembang. WHO menyatakan bahwa prevalensi kejadian anemia ibu hamil adalah 35-75%. Menurut data SDKI 2007 cakupan kegiatan ANC pada kunjungan awal adalah 93,3 % dan kunjungan akhir adalah 81,5%.

Tujuan : Mengetahui hubungan antara frekuensi pemeriksaan antenatal care dan kepatuhan konsumsi tablet besi ada ibu hamil trimester III dengan kadar hemoglobin di Puskesmas Kecamatan Cakung.

Metode : Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil trimester III di Puskesmas Kecamatan Cakung. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampel jenuh. Analisa data pada penelitian ini dengan menggunakan uji korelasi *Pearson*.

Hasil : rata-rata kunjungan ANC $4 \pm 1,83$ kali kunjungan. Sebanyak 90,0% ibu hamil patuh dalam mengkonsumsi tablet besi. Rata-rata kadar Hb adalah $11,59 \text{ gr/dl} \pm 0,91 \text{ gr/dl}$. Ada hubungan antara sikap dan tindakan dengan kepatuhan konsumsi tablet besi ($P < 0.05$). Ada hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet besi dengan kadar Hb ibu hamil ($P < 0.05$).

Kesimpulan : kepatuhan konsumsi tablet besi sangat berpengaruh terhadap kadar Hb ibu hamil sehingga perlu dilakukan monitoring evaluasi secara berkala untuk melihat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet besi.

Kata Kunci : antenatal care, kepatuhan konsumsi tablet besi, kadar Hb ibu hamil.

Daftar Pustaka : 50 (1993 - 2011)