

## ABSTRAK

Nama : Lorani Pago  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSUD dr. Drajat Prawiranegara Serang Banten Tahun 2019

Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda-tanda persalinan dan setelah ditunggu satu jam belum dimulainya tanda persalinan. Kasus Ketuban pecah dini terjadi pada ibu bersalin di RSUD dr. Drajat Prawiranegara Serang Banten mengalami peningkatan kasus sebesar (3%). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ketuban pecah dini itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan *cross sectional* ( $n= 438$  responden) memperoleh hasil bahwa faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini yaitu usia (diperolah nilai  $p = 0,042$ ), gemeli (diperolah nilai  $p = 0,003$ ). Untuk mengurangi jumlah kasus peningkatan kejadian ketuban pecah dini (KPD) di RSUD dr. Drajat Prawiranegara menyarankan sebaiknya pihak rumah sakit dan tenaga tenaga kesehatan lebih banyak memberikan penyuluhan tentang ketuban pecah dini (KPD) terhadap masyarakat, guna sebagai langkah preventif dalam menangani kejadian ketuban pecah dini.

Kata Kunci : Usia, Paritas, Gemeli, ketuban pecah dini  
Pustaka : 1997-2019

## **ABSTRACT**

Name : Lorani Pago  
Study Program : Public Health  
Thesis Title : Factors Associated with Events Premature rupture of membranes in dr. Drajat Prawiranegara Serang Banten in 2019.

Premature rupture of membranes is the rupture of the membranes before there are signs of labor and after an hour of waiting, the signs of labor have not yet started. Premature rupture of membranes occurred in mothers who gave birth at dr. Drajat Prawiranegara Serang Banten experienced an increase in cases (3%). The purpose of this study was to identify the factors that influence the incidence of premature rupture of membranes itself. This research was conducted using a quantitative method with a cross sectional design ( $n = 438$  respondents) obtained the results that the factors associated with premature rupture of membranes were age (obtained value of  $p = 0.042$ ), amusement (value obtained  $p = 0.003$ ). To reduce the number of cases of an increased incidence of premature rupture of membranes in RSUD dr. Drajat Prawiranegara suggested that hospitals and health workers should provide more information about premature rupture of membranes to the community, as a preventive step in dealing with premature rupture of membranes.

Keywords : Age, Parity, Gemeli, premature rupture of membranes

References : 1997-2019