

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
Skripsi, Maret 2014

ROHANI SUSI H.T
2012-33-073

“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HIPERTENSI
INTRADIALISIS PADA PASIEN GGK YANG MENJALANI
HEMODIALISIS DI RUANG HD RSUD CENGKARENG JAKARTA”

Xv + VII Bab + 71 halaman + 9 tabel + 2 Skema + 5 Lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang : Hipertensi intradialisis adalah tekanan darah saat dialisis diatas 140/90 mmHg atau terjadi peningkatan tekanan pada pasien yang sudah mengalami hipertensi pradialisis. Hipertensi yang tidak terkontrol pada saat hemodialisis meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Di ruang Hemodialisa RSUD Cengkareng Jakarta jumlah pasien yang menjalani Hemodialisis dari bulan Agustus 2013 - Oktober 2013 sebesar 443 orang. Pada saat perawat melakukan observasi vital sign ditemukan pasien mengalami hipertensi selama hemodialisis dan pasien mengeluh pusing sehingga Hemodialisis berjalan tidak sesuai dengan program hemodialisis, yang dapat menyebabkan mortalitas dan morbiditas, dan mempengaruhi adekuasi (kecukupan) HD.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Hipertensi intradialisis pada pasien GGK yang menjalani Hemodialisis di ruang Hemodialisis RSUD Cengkareng.

Metode Penelitian : Metode yang digunakan adalah *cross sectional*. Sampel yang digunakan adalah pasien pasien GGK yang menjalani Hemodialisis di ruang Hemodialisis RSUD Cengkareng Jakarta sebanyak 80 orang responden dengan tehnik purposive sampling.

Hasil Penelitian : Sebagian responden adalah rata – rata 50,14 tahun , umur termuda 23 tahun dan tertua 74 tahun. Kelamin laki- laki (61,2%), hipertensi pradialisis (61,2%), Volume *overload* (42,5%), Penarikan cairan (ultrafiltrasi) (42,5%). Hipertensi intradialisis derajat I (51,2%). Hasil uji statistik pradialisis *p – value* 0,025, Volume *overload* *p – value* 0,014, Ultrafiltrasi *p – value* 0,021.

Kesimpulan : Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh hipertensi pradialisis, volume *overload*, Penarikan cairan (ultrafiltrasi) terhadap Hipertensi Intradialisis pada pasie GGK yang menjalani Hemodialisis. Disarankan perawat dapat memberikan edukasi kepada pasien dalam mencegah hipertensi selama dialisis dengan membatasi cairan, mengontrol tensi sebelum dialisis dengan minum obat, dan memberikan masukan kepada pasien agar mengontrol kenaikan berat badan yang terlalu banyak.

Kata Kunci : Hemodialisis, Hipertensi intradialisis, GGK, Ultrafiltrasi, Volume *overload*.

Daftar pustaka : 20 (2006-2013)